20		$x^2 - 3x(9 - x) + 2(9 - x)^2$ (= 0)	$(9 - y)^2 - 3y(9 - y) + 2y^2$ (= 0)			M1 substitution of linear equation into quadratic
		e.g. $6x^2 - 63x + 162$ (= 0) **or** $2x^2 - 21x + 54$ (= 0) allow $2x^2 - 21x = -54$ oe	e.g. $6y^2 - 45y + 81$ (= 0) **or** $2y^2 - 15y + 27$ (= 0) allow $2y^2 - 15y = -27$ oe			A1 (dep on M1) writing the correct quadratic expression in form $ax^2 + bx + c$ (= 0) allow $ax^2 + bx = c$
		e.g. $(2x - 9)(x - 6)$ (= 0) $x = \frac{-(-21) \pm \sqrt{(-21)^2 - 4\times2\times54}}{2\times2}$ e.g. $2\left(\left(x - \frac{21}{4}\right)^2 - \left(\frac{21}{4}\right)^2\right) = -54$	e.g. $(2y - 9)(y - 3)$ (= 0) $y = \frac{-(-15) \pm \sqrt{(-15)^2 - 4\times2\times27}}{2\times2}$ e.g. $2\left(\left(x - \frac{15}{4}\right)^2 - \left(\frac{15}{4}\right)^2\right) = -27$			M1 (dep on M1) for a complete method to solve their 3-term quadratic equation (allow one sign error and some simplification – allow as far as $\frac{21 \pm \sqrt{441 - 432}}{4}$)
		$x = 4.5$ and $x = 6$	$y = 4.5$ and $y = 3$			A1 (dep on M1) both x-values **or** both y-values
				(4.5, 4.5) and (6, 3)	5	A1 (dep on M1) oe Must be paired correctly
						Total 5 marks

20 Alt		$(x - y)(x - 2y)$ (= 0)			M1 for a method to factorise **C**
		$(x - (9 - x))(x - 2(9 - x))$ (= 0)	$(9 - y - y)(9 - y - 2y)$ (= 0)		A1 (dep M1) substitution of **L** into their factorised **C**
		$(2x - 9)(3x - 18)$ (= 0) oe	$(9 - 2y)(9 - 3y)$ (= 0) oe		M1 (dep on M1)
		$x = 4.5$ and $x = 6$	$y = 4.5$ and $y = 3$		A1 (dep on M1) both x-values **or** both y-values
				(4.5, 4.5) and (6, 3) 5	A1 (dep on M1) oe Must be paired correctly
					Total 5 marks